



RAY-GRASS ANGLAIS
DEMI-TARDIF DIPLOÏDE



TIMUCO

Pour une production précoce et sucrée

UTILISATION



DURÉE D'EXPLOITATION

- 4 à 5 ans

IDENTITÉ

- Inscription : 2020
- Cotation : 119,5 (Témoins : Mezo, Tryskal, Rosera)
- Départ en végétation : 30/03
- Début épiaison : 25/05

POINTS FORTS

- Excellente production
- Grande souplesse d'exploitation
- Bon profil maladies
- Très riche en sucres

DOSE DE SEMIS

Dose en pur : de 20 à 25 kg/ha

Dose en association :

- de 20 à 25 kg/ha de TIMUCO + 2 à 3 kg/ha de trèfle blanc
- 12 kg/ha de TIMUCO + 18 kg/ha de RGA 4n



Plus d'infos sur les semences fourragères
sur LGseeds.fr





TIMUCO

RAY-GRASS ANGLAIS
DEMI-TARDIF DIPLOÏDE

POUR UNE PRODUCTION PRÉCOCE ET SUCRÉE

UTILISATION

Pâturage	Affouragement	Ensilage	Enrubannage	Foin
----------	---------------	----------	-------------	------

■ Peu adapté ■ Moyennement adapté ■ Très adapté

RECOMMANDATIONS ET CARACTÉRISTIQUES

Semis :

- Intervenir sur un sol réchauffé pour favoriser la germination.
- Semer à 1 cm de profondeur.
- Pour limiter l'effet ligne et assurer une bonne couverture du sol, il est conseillé d'utiliser un semoir à céréales avec les éléments semeurs relevés en veillant à recouvrir légèrement les semences avec la herse de recouvrement.
- Rouler impérativement derrière le semis pour favoriser un bon contact terre/semences.

Exploitation :


- Dès que la portance le permet, un déprimage par les animaux favorise le tallage et offre ensuite un fourrage de meilleure qualité et un rendement supérieur.
- Exploiter à un stade jeune pour optimiser la qualité : pâturage stade feuillu, fauche dès l'apparition des premiers épis.

Performances de la variété :

- Rendement coupe 1 : 116 % des témoins CTPS (1^{ère} variété sur Herbe-book en 1/2 T)
- Rendement annuel : 114 % des témoins CTPS (3^{ème} variété sur Herbe-book en 1/2 T 2n)
- Remontaison : 2,5/9*
- Souplesse d'exploitation : 55 jours*

*Source Herbe-book 2025

PERFORMANCES DE LA VARIÉTÉ



● Le diamètre des cercles est proportionnel à la tolérance aux maladies.
Source : Résultats CTPS pour l'inscription au catalogue français



Pour une **ration plus efficace**, la **technologie innovante** et **simple d'utilisation** du LG LAB, utilise le proche infrarouge pour acquérir une **connaissance précise des valeurs alimentaires des fourrages**.

NOS CONSEILS DE CONDUITE

- Réaliser un déprimage (pâturage précoce) à la sortie de l'hiver pour favoriser le tallage.
- Au pâturage, des cycles courts améliorent la qualité du fourrage.
- Faucher à une hauteur de 6 à 8 cm.
- Exploiter la parcelle avant l'hiver pour faciliter le redémarrage en végétation au printemps.
- Associer à du trèfle blanc pour favoriser la qualité de la ration et l'alimentation en azote de TIMUCO.

Limagrain Semences de Grandes Cultures



Limagrain

Date d'édition de la fiche : 07/2025

Crédits photos : Julien Greffier. Limagrain Europe - SAS au capital de 10 543 346,75 € - Siège social : CS 50005 63360 Gerzat - France. SIREN 542 009 824 RCS Clermont-Ferrand. Les recommandations d'utilisation fournies sont données à titre purement indicatif et ne sauraient engager la responsabilité de Limagrain Europe à quelque titre que ce soit. Soucieux de vous proposer les meilleures solutions pour la gestion et l'optimisation de votre exploitation, les données vous concernant seront, utilisées pour vous apporter des informations personnalisées par courrier et/ou tout autre moyen de communication. Les données seront conservées pour une durée maximale de 3 ans à compter de leur collecte. Limagrain Europe utilise comme base juridique de ce traitement le consentement des participants et s'engage à ce que le traitement des données des participants soit conforme au Règlement Européen 2016/679 relatif à la protection des données à caractère personnel. Les participants disposent d'un droit d'accès, de rectification et d'effacement à leurs données personnelles. Pour exercer ces droits : Limagrain Europe S.A.S. CS 50005 - Saint-Beauzire - 63360 Gerzat ou mail à DPO-LE@limagrain.com.