

**RAY-GRASS ITALIEN**  
**NON ALTERNATIF TETRAPLOIDE**  
Durée d'exploitation: 18 à 24 mois



**FOURRAGÈRES LG**  
CULTIVER LA QUALITÉ

# MEDICI


La référence des RGI de sa catégorie



## Utilisation



- Productivité exceptionnelle
- La plus faible remontaison
- Excellente tolérance aux maladies
- Très tolérant à la verse



Retrouvez plus d'informations sur [LGseeds.fr](http://LGseeds.fr)



RAY-GRASS ITALIEN  
NON-ALTERNATIF TÉTRAPLOÏDE  
Durée d'exploitation : 18 à 24 mois



# MEDICI

## La référence des RGI de sa catégorie



Inscription : 2018  
Cotation : 113  
(Témoins : Caballo, Udine, Virgyl)  
Départ en végétation : 16/03  
Début épiaison : 08/05

### Utilisation



PÂTURAGE



AFFOURAGEMENT



ENSILAGE



ENRUBANNAGE



FOIN

■ Peu adapté   ■ Moyennement adapté   ■ Très adapté

### Conseils culturaux

#### ■ Semis :

- Intervenir sur un sol réchauffé pour favoriser la germination.
- Semis à 1 cm de profondeur.
- Pour limiter l'effet ligne et assurer une bonne couverture du sol, il est conseillé d'utiliser un semoir à céréales avec les éléments semeurs relevés en veillant à recouvrir légèrement les semences avec la herse de recouvrement.
- Dose en association :  
MEDICI 13 kg/ha + 12 kg/ha de trèfle incarnat
- Rouler impérativement derrière le semis pour favoriser un bon contact terre/semences.
- Surveiller la présence éventuelle de limaces à la levée et intervenir si nécessaire en respectant les précautions d'usage.


#### ■ Exploitation :

- MEDICI ne monte pas en épis l'année du semis = idéal pour optimiser le pâturage.
- Dès que la portance le permet, un déprimage par les animaux favorise le tallage et offre ensuite un fourrage de meilleure qualité et un rendement supérieur.
- Exploiter à un stade jeune pour optimiser la qualité : pâturage stade feuillu, fauche dès l'apparition des premiers épis.

#### ■ Caractères agronomiques :

- Production de printemps : 104.5 % des témoins CTPS
- Tolérance à l'helminthosporiose : 7,5/9 (126 % des témoins CTPS)
- Remontaison : 3.9/9 (22 % moins remontant que les témoins CTPS)
- Tolérance à la verse : 7.1/9 (115 % des témoins CTPS)

### Performances de la variété



Pour une **ration plus efficace**,  
la **technologie innovante**  
et **simple d'utilisation** du LG LAB,  
utilise le proche infrarouge  
pour acquérir une **connaissance précise**  
des **valeurs alimentaires des fourrages**.



### Les points forts

- Production de printemps = 1ère variété
- Production annuelle = 2ème variété
- Faible remontaison = 1ère variété
- Tolérance helminthosporiose = 1ère variété
- Excellente tolérance à la verse

### Nos conseils

- Réaliser un déprimage (pâturage précoce) à la sortie de l'hiver pour favoriser le tallage.
- Faucher une hauteur de 6 à 8 cm.
- Exploiter la parcelle avant l'hiver pour faciliter le redémarrage en végétation au printemps.
- Prolonger de quelques heures la durée de séchage pour la fauche car MEDICI étant tétraploïde, il est plus riche en eau.

Les renseignements fournis dans ce document ne sont donnés qu'à titre indicatif et peuvent varier en fonction des conditions agronomiques et climatiques, ainsi que des techniques culturales. La résistance aux maladies concerne les maladies ou souches actuellement connues en France.



Crédits photos: Watier-Visuel. Impression : Groupe Drouin Maître Imprimeur. Limagrain Europe - SAS au capital de 9 229 894,75€ - Siège social : Biopôle Clermont-Limagne, rue Henri Mondor, 63360 SAINT-BEAUZIRE, France - SIREN 542 009 824 RCS Clermont-Ferrand. Les recommandations d'utilisation fournies sont données à titre purement indicatif. Elles sont susceptibles de varier en fonction des spécificités des zones d'implantations et des conditions de culture. En aucun cas, la responsabilité de LIMAGRAIN EUROPE ne saurait être engagée à cet égard. Septembre 2019.