

COMPOSITION PRAIRIALE
Durée d'exploitation : 5 ans

FOURRAGÈRES LG
CULTIVER LA QUALITÉ

LG RECOR

Une abondance de fourrage en utilisation mixte



Utilisation



- Démarrage précoce
- Très bonne valeur alimentaire
- Adaptée aux sols séchants
- Grande pérennité



Retrouvez plus d'informations
sur LGseeds.fr





COMPOSITION PRAIRIALE - Durée d'exploitation : 5 ans

FOURRAGÈRES LG
CULTIVER LA QUALITÉ

LG RECOR

Une abondance de fourrage en utilisation mixte

Utilisation



PÂTURAGE



AFFOURAGEMENT



ENSILAGE



ENRUBANNAGE



FOIN

● Peu adapté

● Moyennement adapté

● Très adapté




Composition


Composition prairiale de longue durée idéale en usage mixte pour sécuriser la production de fourrage en conditions sèches.

Espèce	Variété	Type variétal	Points forts
Dactyle	ANABA	Très tardif	Grande souplesse d'exploitation, production estivale, très bon état sanitaire, riche en sucres
Fétuque élevée	SOFTANE	Tardif	Très bon rendement, feuilles souples, excellente souplesse exploitation, tolérance aux rouilles
RGA	VAUCLIN	Demi-tardif 4n	Rendement exceptionnel, bon profil sanitaire, bon profil qualité
RGA	ERIT	Tardif 2n	Production coupe 1, souplesse exploitation, faible remontaison, tolérance maladies
Trèfle blanc	BRIANNA	Géant	Agressivité, productivité, forte présence de stolons, faible floraison, pérennité
Trèfle blanc	DEMAND	Intermédiaire	Agressivité intermédiaire, tolérance pâturage : rien à signaler


Composition du mélange



Peuplement dans la prairie



Valeurs alimentaires




Côté ration : couverture des besoins

AJR UFL



AJR PDI



AJR : Apports Journaliers Recommandés
Distribué à 7 kg MS d'ensilage pour une VL de 650 kg produisant 35 kg de lait/j.

Les points forts

- Solution prête à l'emploi aussi bien adaptée au pâturage qu'à la fauche.
- Produit un fourrage riche en protéines grâce au dactyle et au trèfle blanc.
- Très bon étalement de la production annuelle avec un démarrage précoce et une bonne pousse estivale.

Nos conseils

- Éviter les implantations en sols humides (dactyle).
- Faire un déprimage (pâturage précoce) sortie hiver.
- Faucher à une hauteur de 6 à 8 cm.
- En fauche, exploiter au stade début épiaison (meilleur compromis rendement et qualité).
- Nettoyer la parcelle avant l'hiver par un pâturage ou une exploitation rase.

Les renseignements fournis dans ce document ne sont donnés qu'à titre indicatif et peuvent varier en fonction des conditions agronomiques et climatiques, ainsi que des techniques culturales. La résistance aux maladies concerne les maladies ou souches actuellement connues en France.