

RAY-GRASS ANGLAIS DEMI-TARDIF
TÉTRAPLOIDE
Durée d'exploitation : 4 à 5 ans



FOURRAGÈRES LG
CULTIVER LA QUALITÉ

VAUCLIN

L'excellence à tout point de vue !



Utilisation



- Rendement exceptionnel
- Souplesse d'exploitation record
- Très faible remontaison
- Très tolérant à la rouille
- Forte teneur en sucres



Retrouvez plus d'informations
sur LGseeds.fr





RAY-GRASS ANGLAIS DEMI-TARDIF TÉTRAPLOÏDE
Durée d'exploitation : 4 à 5 ans



VAUCLIN

L'excellence à tout point de vue !



Inscription : 2017
Cotation CTPS : 126,3 %
(Témoins : Cantalou, Lactal, Barelan)
Date départ en végétation : 01/04
Date début épiaison : 24/05

Utilisation



PÂTURAGE



AFFOURAGEMENT



ENSILAGE



ENRUBANNAGE



FOIN

■ Peu adapté ■ Moyennement adapté ■ Très adapté

Conseils culturaux

■ Semis :

- Intervenir sur un sol réchauffé pour favoriser la germination.
- Semis à 1 cm de profondeur.
- Pour limiter l'effet ligne et assurer une bonne couverture du sol, il est conseillé d'utiliser un semoir à céréales avec les éléments semeurs relevés en veillant à recouvrir légèrement les semences avec la herse de recouvrement.
- Dose en pur : de 25 à 30 kg/ha.
- Dose en association :
VAUCLIN 25 à 30 kg/ha + 2 à 3 kg de trèfle blanc
RGA 2n 12 kg/ha + VAUCLIN 4n 18 kg/ha.
- Rouler impérativement derrière le semis pour favoriser un bon contact terre/semences.
- Surveiller la présence éventuelle de limaces à la levée et intervenir si nécessaire en respectant les précautions d'usage.

■ Exploitation :


- Dès que la portance le permet, un déprimaie par les animaux favorise le tallage et offre ensuite un fourrage de meilleure qualité et un rendement supérieur.
- Nettoyer la parcelle avant l'hiver pour favoriser le redémarrage au printemps suivant.

■ Caractères agronomiques :

- Tolérance à la rouille : 7,5/9 (source Herbe book)
- Souplesse d'exploitation : 62 jours (119 % des témoins CTPS)
- Remontaison : 2,9/9 (15 % moins remontant que les témoins CTPS)
- Teneur en sucres : 22,4 % (106 % des témoins CTPS)

Performances de la variété

Résultats de l'inscription CTPS face aux témoins correspondants



Pour une **ration plus efficace**, la **technologie innovante** et **simple d'utilisation** du LG LAB, utilisez le proche infrarouge pour acquérir une **connaissance précise des valeurs alimentaires des fourrages**.



Les points forts

- Excellent rendement de printemps, été/automne et annuel.
- Une des variétés les moins remontante de ce groupe de précocité = qualité préservée.
- La meilleure souplesse d'exploitation de son créneau.
- Tolérance aux rouilles exceptionnelle.
- Très riche en sucres pour une meilleure appétence et une conservation facilitée en ensilage.

Nos conseils

- Réaliser un déprimaie (pâturage précoce) sortie hiver pour favoriser le tallage.
- Faucher une hauteur de 6 à 8 cm.
- Au pâturage, des cycles courts améliorent la qualité du fourrage.
- Exploiter la parcelle avant l'hiver pour faciliter le redémarrage en végétation au printemps.
- Associer à du trèfle blanc pour favoriser la qualité de la ration et l'alimentation en azote de VAUCLIN.

Les renseignements fournis dans ce document ne sont donnés qu'à titre indicatif et peuvent varier en fonction des conditions agronomiques et climatiques, ainsi que des techniques culturales. La résistance aux maladies concerne les maladies ou souches actuellement connues en France.