

COMPOSITION PRAIRIALE
Durée d'exploitation : 5 ans



FOURRAGÈRES LG
CULTIVER LA QUALITÉ



LG RUSTICOR

La rusticité qualitative



Utilisation



- Démarre tôt au printemps
- Bonne tolérance à la sécheresse et rustique
- Faible remontaison
- Excellent rendement et qualité alimentaire



Retrouvez plus d'informations
sur LGseeds.fr





COMPOSITION PRAIRIALE
Durée d'exploitation : 5 ans

LG RUSTICOR

La rusticité qualitative



FOURRAGÈRES LG
CULTIVER LA QUALITÉ

Utilisation



PÂTURAGE



AFFOURAGEMENT



ENSILAGE



ENRUBANNAGE



FOIN




● Peu adapté ● Moyennement adapté ● Très adapté

Composition prairiale de longue durée idéale en usage mixte pour sécuriser la production de fourrage en conditions séchantes.


Composition

Espèce	Variété	Type variétal	Points forts
Fétuque élevée	SWEETY	Très tardive	Excellent rendement, forte tolérance à la rouille, teneur en sucres record
Dactyle	ANABA	Très tardif	Tolérance sec, rendement, vigueur sortie hiver, souplesse exploitation, riche en sucres
RGA	VAUCLIN	Demi-tardif 4n	Rendement exceptionnel, profil sanitaire, profil qualité, très riche en sucres
Fléole	COMER	-	Rendement, appétence, qualité du fourrage au printemps
Trèfle blanc	BRIANNA	Géant	Agressivité, productivité, forte présence de stolons, pérennité
Trèfle blanc	DEMAND	Intermédiaire	Agressivité intermédiaire, tolère pâturage ras


Composition du mélange




Peuplement dans la prairie



Valeurs alimentaires



Côté ration : couverture des besoins



AJR : Apports Journaliers Recommandés
Distribué à 7 kg MS d'ensilage pour une VL de 650 kg produisant 35 kg de lait/j.

Les points forts

- Composition à usage parfaitement mixte
- Démarre tôt au printemps et pousse presque toute l'année
- Bonne tolérance à la sécheresse
- Très faible remontaison = qualité préservée
- Ration équilibrée et riche en protéines

Nos conseils

- Éviter les implantations en sols humides (dactyle).
- Faire un déprimage (pâturage précoce) sortie hiver.
- Faucher à une hauteur de 6 à 8 cm.
- En fauche, exploiter au stade début épiaison (meilleur compromis rendement et qualité).
- Nettoyer la parcelle avant l'hiver par un pâturage ou une exploitation rase.

Les renseignements fournis dans ce document ne sont donnés qu'à titre indicatif et peuvent varier en fonction des conditions agronomiques et climatiques, ainsi que des techniques culturales. La résistance aux maladies concerne les maladies ou souches actuellement connues en France.