

COLZA FOURRAGER HYBRIDE
Durée d'exploitation : 3 à 6 mois



FOURRAGÈRES LG
CULTIVER LA QUALITÉ



INTERVAL

Le plus rapide, c'est l'hybride



Utilisation



- Variété hybride
- Implantation très rapide
- Rendement exceptionnel
- Appétence inégalée
- Très bonne tolérance à l'oïdium



Retrouvez plus d'informations
sur LGseeds.fr





COLZA FOURRAGER HYBRIDE
Durée d'exploitation : 3 à 6 mois



INTERVAL

Le plus rapide, c'est l'hybride



Type variétal : Type hiver «00» Hybride

Cycle de production : 70 à 80 jours

Teneur en MS : 11,5 à 12,5 %

Utilisation



PÂTURAGE



AFFOURAGEMENT



ENSILAGE



ENRUBANNAGE



FOIN

■ Peu adapté ■ Moyennement adapté ■ Très adapté

Conseils culturaux

Semis :

- Intervenir sur un sol réchauffé pour favoriser la germination.
- Semis à 1 cm de profondeur.
- Période : fin printemps en conditions non séchantes ou fin été/automne.
- Pour limiter l'effet ligne et assurer une bonne couverture du sol, il est conseillé d'utiliser un semoir à céréales avec les éléments semeurs relevés en veillant à recouvrir légèrement les semences avec la herse de recouvrement.
- Dose en pur : 8 kg/ha.
- Dose en association :
INTERVAL 5 kg/ha + 20 kg de ray-grass italien non-alternatif 2n.
- Rouler impérativement derrière le semis pour favoriser un bon contact terre/semences.
- Surveiller la présence éventuelle de limaces à la levée et intervenir si nécessaire en respectant les précautions d'usage.

Exploitation :


- Le pâturage peut commencer environ 60 à 70 jours après le semis.

Intérêt économique :

- Bénéfice MAT comparé au témoin : + 250 kg/ha (200 €/ha)*.
- Bénéfice UFL comparé au témoin : + 750 UFL/ha (100 €/ha)*.

* Tourteau soja à 50 % MAT/sec soit à 0,390 €/kg
et Orge à 1 UFL/kg à 0,130 €/kg

Valeurs alimentaires



Pour une ration plus efficace, la technologie innovante et simple d'utilisation du LG LAB, utilise le proche infrarouge pour acquérir une connaissance précise des valeurs alimentaires des fourrages.



Les points forts

- Une révolution sur le marché du colza fourrager.
- Rendement largement supérieur aux autres variétés.
- Installation rapide.
- Variété hybride extrêmement appétente.
- Très bonne tolérance à l'oïdium.

Nos conseils

- Idéal pour une production rapide de fourrage.
- Fourrage adapté pour les bovins et ovins à forts besoins.
- Limiter la consommation entre 2 et 3 kg MS/vache/jour.
- Pour éviter de donner un goût au lait, ne pas faire consommer moins d'une heure avant la traite.
- Démarrer l'exploitation à un stade jeune et faire si possible un semis décalé pour optimiser la qualité du fourrage.

Les renseignements fournis dans ce document ne sont donnés qu'à titre indicatif et peuvent varier en fonction des conditions agronomiques et climatiques, ainsi que des techniques culturales. La résistance aux maladies concerne les maladies ou souches actuellement connues en France.